

Den 13 Oktober.

Crotopns, nytt genus ibland Ichneumoniderna, beskrifvet af Aug. Emil Holmgren. — Denna afhandling inlemnades af Hr BOHEMAN.

»Då man ibland Ichneumoniderna, hvilka i allmänhet i afseende på sin kroppsbildning följa en gifven bestämd grundtyp, finner så afvikande former som hos det djur, hvilket jag härnedan beskrifvit, måste detta anses såsom en ganska sällsam företeelse. Såväl af denna omständighet, som derigenom att det samma, enligt min åsigt, rättast bör bilda en egen familj, har jag blifvit föranledd att icke dröja med dess bekantgörande. I afseende på öfverensstämmelsen med de öfriga Ichneumonid-familjerna synes detta nybildade genus stå nära Crypti, ehuru man hos detsamma kan spåra en ej obetydlig likhet, särdeles hvad vingarnas nervförgrening beträffar, med slägget *Thersilochus* inom Ophionidernas familj. Om djurets lefnadssätt veta vi föga mer än att det uppehåller sig bland gräs vid sjöstränder, just på sådana ställen som tjena till uppehåll för vissa *Steni*, med hvilka hufvudets bildning hos detta djur har en öfverraskande likhet. Andra författare hafva icke, såvidt jag kunnat utröna, i sina arbeten omnämnt detsamma.

CROTOPUS HOLMGR

Caput transversum a fronte visum subtriangulare; genæ infra oculos longe descendentes.

Clypeus convexus, obtusus.

Mandibulae majuscule, denticulis duobus inter se valde inæquilibus apice instructæ.

Palpi maxillares longiusculi, filiformes, 5-articulati.

Antennæ filiformes; articulus primus flagelli 2:do longior.

Oculi leviter prominuli, subparvi, integri.

Thorax robustus; scutellum spina longa apice armatum; metathorax areis superioribus instructus, spiraculis obsoletissimis.

Abdomen ovatum, petiolatum; segmentum primum æquilatum, lineis longitudinalibus elevatis instructum, spiraculis ante medium sitis, valde obsoletis; segmenta ventralia convexa, plica nulla; terebra ♀ breviter exserta.

Alæ subangustæ; areola nulla; cellula radialis brevissima, subtrapeziformis; angulus areolaris fere rectus.

Pedæ graciles; tibiæ posteriores apice bicarinate; condyli tarsorum spurii.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh., d. 13 Oktober 1858.

CROTOPUS ABNORMIS HOLMGR.

Niger, griseofusco-pubescent; alis anticis obsolete (♂); aut distincte (♀) fuscō-fasciatīs. — (Long. 1½—2 lin.).

Habitat in graminosis ad littora lacuum per Sueciam meridionalem, rarius; scilicet in Scania (MUNCH AF ROSEN SKJÖLD); in Smolandia ad Näsbyholm (BOHEMAN); in Vestrogothia (GYLLENHAL).

Caput pone oculos vix angustatum; fronte sulcis duobus longitudinalibus instrncta. Clypeus discretus, convexus, longitudine vix latior, apice obtuse rotundatus. Mandibulæ longiusculæ, leviter curvatae, dente exteriore quam interiore multo longiore. Antennæ maris dimidio corpore paulo longiores; feminæ breviores; utriusque sexus filiformes, porrectæ; scapo non exciso. Scutellum in spinam longam, validam, sursum leviter curvatam productum. Metathorax multo humilior quam mesothorax; areis superioribus 3 longiusculis; area posteromedia minuta. Segmentum primum abdominis posticorum pedum coxis cum trochanteribus longitudine æquale, parum elevatum, aequilatum, lineis longitudinalibus a basi ad apicem extensis instructum, spatio interacente planiusculo; 2 et 3 transversa, puberula, inter se imperfecte discreta. Alæ nervo transverso anali infra medium fracto; radiali interno segmento costæ tertio nonnihil longiore. Pedes graciles.
